



Tên thông thường : Bướm phượng đen
Tên khoa học : *Papilio polytes* Linnaeus
Họ : Papilionidae

Hình thái:

Bướm phượng đen có kích thước trung bình, sải cánh dao động từ 8-13cm. Loài bướm này nổi tiếng với vẻ đẹp bí ẩn và đầy lôi cuốn với bộ cánh màu đen tuyền cùng những hoa văn nổi bật.

Bướm đực và bướm cái có hình thái rất khác biệt:

- Bướm đực có cánh trước màu đen tuyền, như nhung, phía gốc cánh có các đốm màu trắng.
- Bướm cái có cánh trước màu đen nhạt hơn bướm đực, cánh sau có một số đốm đỏ về phía góc khá nổi bật.

Vòng đời của bướm phượng đen:

Vòng đời của bướm phượng đen, cũng như các loài bướm khác, trải qua bốn giai đoạn: trứng, ấu trùng (sâu), nhộng và trưởng thành.

- Giai đoạn trứng: Bướm cái đẻ trứng trên lá của một số loài cây (ký chủ) thuộc họ cam quýt (Rutaceae); trứng có hình cầu, nhỏ, màu trắng đục. Sau khoảng 3-5 ngày, trứng nở thành ấu trùng.

- Giai đoạn ấu trùng (sâu bướm): có màu xanh lá cây với các sọc đen và vàng. Sâu ăn lá của cây ký chủ và phát triển nhanh. Sau khoảng 2-3 tuần, ấu trùng trưởng thành và bắt đầu tìm nơi để hóa nhộng.

- Giai đoạn nhộng: Ấu trùng tạo ra một kén bằng tơ và biến đổi thành nhộng. Nhộng có màu nâu hoặc xanh lá cây và vỏ ngoài hơi cứng.

- Giai đoạn trưởng thành: bướm phượng đen sẽ chui ra khỏi kén (sau khoảng 1-2 tuần), khi mới nở có cánh mềm và ẩm, nhưng sẽ nhanh khô và cứng lại.

Bướm trưởng thành sẽ tìm thức ăn và bắt đầu giao phối.

Sau khi giao phối, bướm cái sẽ đẻ trứng và bắt đầu một vòng đời mới.

Tập tính & phân bố:

Bướm phượng đen thường bay đến các loài hoa có màu sắc sỡ như hoa duyên cúc, hoa huệ, hoa dâm bụt,... để hút mật.

Cây ký chủ (Cây chủ):

Ấu trùng loài bướm này thích ăn lá của các loài thuộc họ Chanh (Rutaceae), như: cam, chanh (*Citrus*), nguyệt quế (*Murraya*), cơm rọu (*Glycosmis*),...

Phân bố:

Loài bướm này phân bố rộng rãi ở khắp châu Á, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á. Phổ biến ở Việt Nam, thường gặp ở các tỉnh Nam Trung bộ.

HÌNH ẢNH
(Tại Khu du lịch Đảo Hoa lan)



Hình 1: Bướm đực



Hình 2: Bướm cái